

RORUM



NÁTTÚRUSTOFA
Norðurlands vestra

Fugla- og gróðurskoðun við Fellsenda og Galtalæk í Hvalfirði



RORUM 2026-005

Rorum 2026 005	Dags. 15.10.26	Dreifing: Opin	Fjöldi síðna: 18
ISSN 2547-6696			
Heiti skýrslu: Fugla- og gróðurskoðun við Fellsenda og Galtalæk í Hvalfirði.			
Höfundur: Starri Heiðmarsson Valtýr Sigurðsson Sigurður Ívar Jónsson Jón M. Einarsson Þorleifur Eiríksson			
Framkvæmd: RORUM og Náttúrustofa Norðurlands vestra			
Unnið fyrir: Verkís			
Útdráttur: Fugla- gróðurskoðun var framkvæmd á Fellsenda og Galtalæk við Grundartanga í Hvalfirði. Fuglar voru skoðaðir á varptíma, en á Galtalæk einnig sumar og haust. Fuglalíf við Fellsenda og Galtalæk var eins og við var búist og einkenndist af mófuglum. Ekki sáust umferðarfuglar svo sem rauðbrystingar eða tildrur um sumarið eða haustið. Allir fuglar sem sáust eru algengir fuglar og ættu að vera algengir í nágrenninu. Vistgerðir voru kortlagðar og tegundir æðplantna skráðar. Engar sjaldgæfar æðplöntutegundir fundust né tegundir á válista. Mest var um graslendi og mólendi á svæðunum. Nokkur þekja starungsmýrarvistar var við Galtarvík.			
RORUM ehf. • Lynghál 10 • 110 Reykjavík • +354 8977395 • rorum@rorum.is • www.rorum.is			

Efnisyfirlit

Innihald

1	Inngangur	5
2	Fuglar	5
2.1	Inngangur	5
2.2	Aðferðir	5
2.3	Niðurstöður	9
2.4	Umræður	10
3	Gróður og vistgerðir	10
3.1	Inngangur	10
3.2	Aðferðir	11
3.3	Niðurstöður	11
3.4	Umræður	14
4	Lokaumræður	15
5	Þakkir	15
6	Heimildir	15
7	Viðaukar	17
7.1	Æðplöntutegundir fundnar í og við áætlað framkvæmdasvæði við Fellsenda.	17
7.2	Æðplöntutegundir fundnar í áætluðu framkvæmdasvæði við Galtarvík.	18

Myndir

Mynd 2-1. Kort af Fellsenda og fuglaskoðunarlínur.	6
Mynd 2-2. Frá Fellsenda.....	6
Mynd 2-3. Kort af Galtalæk og fuglaskoðunarlínur.	7
Mynd 2-4. Frá Galtalæk. Sjá má Grundartanga í bakgrunni.	7
Mynd 2-5. Fjaran við Galtalæk.....	8
Mynd 2-6. Skarfar í fjöru við Galtalæk.....	8
Mynd 2-7. Sandfjara og malafjara við Galtalæk.	9
Mynd 3-1. Vistgerðir og hlutfallsleg útbreiðsla þeirra að Fellsenda. Flórupunktur, 1-9, eru merktir þar sem æðplöntutegundir voru skráðar en tegundalistann má finna í viðauka.	11
Mynd 3-3. Vistgerðir og hlutfallsleg útbreiðsla þeirra við Galtarvík. Flórupunktur, 1-6, 8 og 9, eru merktir þar sem æðplöntutegundir voru skráðar en tegundalistann má finna í viðauka.	13

Töflur

Tafla 2.1. Tegundir fugla, fjöldi einstaklinga og válistaflokkun við Fellsenda.....	9
Tafla 2.2. Tegundir fugla, fjöldi einstaklinga og válistaflokkun við Galtalæk.....	10
Tafla 3.1. Vistgerðir, flatarmál þeirra í hektörum og hlutfallsleg útbreiðsla að Fellsenda.	12
Tafla 3.2. Vistgerðir, flatarmál þeirra í hektörum og hlutfallsleg útbreiðsla við Galtarvík.	14

1 Inngangur

Samkvæmt beiðni Verkís framkvæmdi Rorum og Náttúrustofa Norðurlands vestra fugla- og gróðurskoðun á tveimur svæðum; Fellsenda og Galtalæk við Grundartanga í Hvalfirði.

2 Fuglar


2.1 Inngangur

Talsverðar athuganir hafa verið gerðar á fuglum í nágrenni Grundartanga í Hvalfirði (Árni Einarsson 1983; Kristinn Haukur Skarphéðinsson o.fl. 1994; Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2004; Þorleifur Eiríksson o.fl. 2024; Starri Heiðmarsson og Þorleifur Eiríksson 2025). Þessar athuganir eru hafðar til hliðsjónar við mat á fuglalífi á Galtalæk og Fellsenda.

2.2 Aðferðir

Á loftmyndir af Fellsenda og Galtalæk voru dregnar línur sem gengið var eftir við fuglaskoðun (Mynd 2-1, Mynd 2-3). Athuganir við Fellsenda fóru fram á varptíma (13.06.2026). Á Galtalæk fóru athuganir einnig fram á varptíma (13.06.2026), en einnig var fjaran og nágrenni skoðuð um sumarið (15.07.2026) og haustið (12.09.2026) til að athuga hvort fjaran væri notuð af umferðarfuglum svo sem rauðbrystingi (*Calidris canutus*) og tildru (*Arenaria interpres*).

Fellsendi einkennist af graslendi og holtum (Mynd 2-2). Galtalækur einkennist af vel grónu graslendi (Mynd 2-4). Fjaran er klapparfjara með sandi og mól í vikum, vaxin þangi (Mynd 2-5, Mynd 2-6, Mynd 2-7).



Mynd 2-1. Kort af Fellsenda og fuglaskoðunarlínur.



Mynd 2-2. Frá Fellsenda.



Mynd 2-3. Kort af Galtalæk og fuglaskoðunarlínur.



Mynd 2-4. Frá Galtalæk. Sjá má Grundartanga í bakgrunni.



Mynd 2-5. Fjaran við Galtalæk.



Mynd 2-6. Skarfar í fjöru við Galtalæk.



Mynd 2-7. Sandfjara og malafjara við Galtalæk.

2.3 Niðurstöður

Við fuglaathuganir á Fellsenda fundust tíu tegundir fugla; grágæs, heiðagæs, álft, hrossagaukur, heiðlóa, spói, þúfutittlingur, skógarpröstur, hrafn og kjói. Allar tegundir líklega varpfuglar (Tafla 2.1). Allt eru þetta algengir íslenskir fuglar og líklega algengir í nágrenninu. Válistaflokkun er í töflu (Náttúrufræðistofnun 2025).

Tafla 2.1. Tegundir fugla, fjöldi einstaklinga og válistaflokkun við Fellsenda.

Nafn	Fræðiheiti	Fjöldi	Válisti
Grágæs	<i>Anser anser</i>	2	NT
Heiðagæs	<i>Anser barachyrhynchus</i>	2	LC
Álft	<i>Cygnus cygnus</i>	2	LC
Hrossagaukur	<i>Gallinago gallinago</i>	2	LC
Heiðlóa	<i>Pluvialis apricaria</i>	1	VU
Spói	<i>Numenius phaeopus</i>	11	VU
Þúfutittlingur	<i>Anthus pratensis</i>	3	LC
Skógarpröstur	<i>Turdus iliacus</i>	2	LC
Hrafn	<i>Corvus corax</i>	2	VU
Kjói	<i>Stercorarius parasiticus</i>	2	EN

Við Galtalæk fundust átta tegundir á varptíma: Grágæs, stelkur, hrossagaukur, heiðlóa, Jaðrakan, spói, tjaldur, hrafn, sílamáfur og fýll. Um sumarið sáust: Dílaskarfur, grágæs, æðarfugl, stelkur, tjaldur, sendlingur og þúfutittlingur. Um haustið sáust: Dílaskarfur, grágæs, æðarfugl, stökkönd og tjaldur (

Tafla 2.2).

Tafla 2.2. Tegundir fugla, fjöldi einstaklinga og válistaflokkun við Galtalæk.

Nafn	Fræðiheiti	Fjöldi				Válisti
		Varptími	Sumar	Haust		
Dílaskarfur	<i>Phalacrocorax carbo</i>		1	9		LC
Grágæs	<i>Anser anser</i>	12	1	32		NT
Æðarfugl	<i>Somateria mollissima</i>		9	1		NT
Stökkönd	<i>Anas platyrhynchos</i>			3		LC
Stelkur	<i>Tringa totanus</i>	6	4			LC
Hrossagaukur	<i>Gallinago gallinago</i>	6				LC
Heiðlóa	<i>Pluvialis apricaria</i>	2				VU
Jaðrakan	<i>Limosa limosa</i>	2				NT
Spói	<i>Numenius phaeopus</i>	8				VU
Tjaldur	<i>Haematopus ostralegus</i>	5	16	4		NT
Sendlingur	<i>Calidris maritima</i>		9			LC
Þúfutittlingur	<i>Anthus pratensis</i>		4			LC
Skógarpröstur	<i>Turdus iliacus</i>			1		LC
Hrafn	<i>Corvus corax</i>	2				VU
Kría	<i>Sterna paradisaea</i>		2			LC
Sílamáfur	<i>Larus fuscus</i>	210	302	25		LC
Svarfbakur	<i>Larus marinus</i>		9	1		LC
Fýll	<i>Fulmarus glacialis</i>	10	3			LC

2.4 Umræður

Fuglalíf við Fellsenda og Galtalæk var eins og við var búist (Þorleifur Eiríksson o.fl. 2024; Starri Heiðmarsson og Þorleifur Eiríksson 2025).

Fuglar sem sáust á varptíma; Grágæs, stelkur, hrossagaukur, heiðlóa, Jaðrakan, spói, tjaldur, hrafn, sílamáfur og fýll eru allt líklegir varpfuglar nema hrafn og fýll. Þúfutittlingur og stelkur sem sáust um sumarið er líka líklega varpfuglar.

Nokkrir sendlingar sáust um sumarið. Umferðarfuglar eins og rauðbrystingur eða tildra sáust hvorki um sumarið né haustið, sem kom á óvart þar sem fjaran við Galtalæk ætti að henta tildru (Mynd 2-7).

Allir fuglar sem sáust eru algengir fuglar og ættu að vera algengir í nágrenninu.

3 Gróður og vistgerðir

3.1 Inngangur

Vöktun gróðurs í nágrenni iðnaðarsvæðisins á Grundartanga er allmikil og er m.a. fylgst með þekjubreytingum á klapparreitum sem einkum eru vaxnir fléttum og mosum auk þess sem tekin eru sýni af gróðri til efnagreininga. Frá niðurstöðum umhverfisvöktunarinnar er greint í árlegum

skýrslum (Eva Yngvadóttir o.fl. 2025). Æðplöntuflóra svæðisins eða vistgerðir hafa ekki verið vaktaðar sérstaklega í tengslum við umhverfisvöktunina en árið 1983 kom út skýrsla á vegum Líffræðistofnunar Háskólans þar sem fjallað var um æðplöntur, mosa og fléttur í nágrenni Grundartanga (Hörður Kristinsson o.fl. 1983). Þar kemur fram að á svæðinu hafi fundist 142 tegundir æðplantna.


3.2 Aðferðir

Kortlagning vistgerða að Fellsenda og könnun flóru að Fellsenda og Galtarvík var gerð á vettvangi 23. júní 2026. Sama dag voru vistgerðir sannreynðar við Galtarvík, byggt á korti sem teiknað var út frá loftmyndum af Sigmari Metúsalemssyni á Eflu. Gengið var um svæðin og hliðsjón höfð af 3. útgáfu vistgerðakorts Náttúrufræðistofnunar við vistgerðakortlagninguna. Sérstaklega var litið eftir tegundum æðplantna sem eru á válista eða teljast sjaldgæfar en gerðir voru tegundalistar fyrir hvert svæði fyrir sig byggt á mismörgum punktum innan og rétt við framkvæmdasvæðið á hvorum stað fyrir sig eftir aðstæðum. Latnesk heiti æðplantna fylgja tékklista yfir íslenskar æðplöntur eftir Pawel Wasowicz (2020).

3.3 Niðurstöður

Sjö vistgerðir voru kortlagðar á væntanlegu áhrifasvæði að Fellsenda og er graslendi mest áberandi og með rúmlega 70% af heildarþekju svæðisins. Þrátt fyrir að svæðið hafi verið ræst fram fyrir allnokkru síðan má enn finna starungsmýrarvist á tæplega 9% svæðisins. Gerð er grein fyrir þekju einstakra vistgerða í töflu 3.1.

Fellsendi — vistgerðir




Mynd 3-1. Vistgerðir og hlutfallsleg útbreiðsla þeirra að Fellsenda. Flórupunktur, 1-9, eru merktir þar sem æðplöntutegundir voru skráðar en tegundalistann má finna í viðauka.

Á svæðinu við Fellsenda fundust 74 tegundir æðplantna og er gerð grein fyrir tegundunum og algengni þeirra byggt á aðferðarfræði sem sett var fram á vegum Náttúrufræðistofnunar Íslands 2001 (Sigurður H. Magnússon o.fl. 2001) í viðauka.

Tafla 3.1. Vistgerðir, flatarmál þeirra í hektörum og hlutfallsleg útbreiðsla að Fellsenda.

Vistgerð	Svæði (ha)	Hlutfall (%)
L5.3 Hraungambravist	0,6	2,9
L8.9 Starungsmýravist	1,8	8,8
L9.4 Snarrótarvist	3,3	16,5
L9.5 Grasengjavist	4,7	23,1
L9.6 Língrís- og vingulsvist	5,9	29,2
L10.2 Flagmóavist	0,4	2,0
L10.4 Grasmóavist	3,1	15,2
Skurðir og lækir	0,5	2,3
Samtals	20,3	100

Ellefu þurrlendisvistgerðir voru kortlagðar á áhrifasvæðinu við Galtarvík auk þess sem þrjár fjöruvistgerðir eru til staðar en umfjöllun um þær er ekki efni þessarar skýrslu. Mólendi og graslendi eru útbreiddust og þekja grasmóavist og snarrótarvist rúmlega helming svæðisins. Gerð er grein fyrir þekju einstakra vistgerða í töflu 3-2.



Mynd 3-2. Vistgerðir og hlutfallsleg útbreiðsla þeirra við Galtarvík. Flórupunktur, 1-6, 8 og 9, eru merktir þar sem æðplöntutegundir voru skráðar en tegundalistann má finna í viðauka.

Tafla 3.2. Vistgerðir, flatarmál þeirra í hektörum og hlutfallsleg útbreiðsla við Galtarlæk.

Vistgerð	Svæði (ha)	Hlutfall (%)
L1.3 Mosamelavist	0,3	0,4
L8.9 Starungsmýravist	8,7	11,5
L9.4 Snarrótarvist	16,2	21,4
L9.5 Grasengjavist	5,2	6,9
L9.6 Língresis- og vingulsvist	9,4	12,5
L10.1 Mosamóavist	6,0	8,0
L10.2 Flagmóavist	1,5	2,0
L10.4 Grasmóavist	24,3	32,1
L14.1 Þéttbýli og annað manngert	3,6	4,8
L14.3 Skógrækt	1,1	1,4
L14.4 Alaskalúpína	0,4	0,5
Bólupangsfjörur	0,1	0,1
Klópangsfjörur	5,5	7,3
Líflitlar sandfjörur	1,4	1,
Samtals	75,5	100

Á svæðinu við Galtarlæk fundust 87 tegundir æðplantna og er gerð grein fyrir tegundunum og algengni þeirra byggt á aðferðarfræði sem sett var fram á vegum Náttúrufræðistofnunar Íslands 2001 (Sigurður H. Magnússon o.fl. 2001) í viðauka.

3.4 Umræður

Æðplöntuflóra svæðanna er dæmigerð fyrir svæðið og fundust engar sjaldgæfar tegundir við rannsóknina né tegundir á válista æðplantna .

Svæðið við Fellsenda er að stórum hluta framræst votlendi sem þrátt fyrir það inniheldur ennþá nokkuð af starungsmýravist eða tæplega 2 ha. Kortlagt svæði við Fellsenda er um 20 ha að stærð og þekur graslendi langstærsta hluta þess eða rúmlega 70%.

Fleiri vistgerðir voru kortlagðar við Galtarlæk enda um stærra svæði að ræða auk þess sem fjölbreytni þess er meiri. Þar hafði grasmóavist mesta þekju en graslendisvistirnar snarrótarvist og língresis- og vingulsvist höfðu einnig allnokkra þekju. Alls voru starungsmýrar kortlagðar á tæplega 9 hektörum en mýrar sem þekja samfelld meira en 2 ha njóta sérstakrar verndar skv. 61. grein laga um náttúruvernd nr. 60/2013. Starungsmýrarnar við Galtarlæk eru staðsetta á fjórum stöðum og eru einhverjar mýranna ekki tveir hektarar að stærð. Æskilegt væri að komast hjá því að raska mýrunum eftir mætti.

4 Lokaumræður

Fuglalíf við Fellsenda og Galtalæk var eins og við var búist og einkenndist af mófuglum. Ekki sáust umferðarfuglar svo sem rauðbrystingar eða tildir um sumarið eða haustið. Allir fuglar sem sáust eru algengir fuglar og ættu að vera algengir í nágrenninu.

Æðplöntuflóran er dæmigerð og án sjaldgæfra eða friðaðra tegunda. Vistgerðirnar báru þess merki að um landbúnaðarland er að ræða sem hefur að hluta verið framræst en grasengjavist þróast oft á slíku landi. Rétt er að benda á starungsmýrar, stærri en tveir hektarar, eru við Galtarvík og ætti reyna að komast hjá að raska þeim við framkvæmdir á svæðinu.

5 Þakkir

Sturla Frostason hjá Rorum aðstoðaði við fuglaskoðun. Sigmar Metúsalemsson hjá Eflu gerði vistgerðakort af Galtarvík (Mynd 3-2).

6 Heimildir

Árni Einarsson 1983. Fuglalíf við Grundartanga. Líffræðistofnun Háskólans.

Eva Yngvadóttir, Snævarr Örn Georgsson Páll Höskuldsson og Anna Margrét Kornelíusdóttir. 2024. Umhverfisvöktun iðnaðarsvæðisins á Grundartanga. Niðurstöður ársins 2024. Unnið fyrir Elkem Ísland ehf., Norðurál Grundartangi ehf. og Alur Álvinnsla ehf.. Reykjavík: Efla Verkfræðistofa.

Hörður Kristinsson, Bergþór Jóhannsson og Eypór Einarsson 1983. Grasafræðirannsóknir við Hvalfjörð. Líffræðistofnun Háskólans. Fjölrit nr. 17

Jón Gunnar Ottósson, Anna Sveinsdóttir og María Harðardóttir, ritstj. 2016. *Vistgerðir á Íslandi*. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar nr. 54. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.

Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2004. Fuglalíf við Katanes í Hvalfirði. NÍ-04009. Unnið fyrir Hönnun hf.

Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Gunnlaugur Pétursson og Jóhann Óli Hilmarsson 1994. Útbreiðsla varpfugla á Suðvesturlandi. Könnun 1987-1992. Náttúrufræðistofnun Íslands. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar 25.

Lög um náttúruvernd nr. 60/2013.

Náttúrufræðistofnun 2025 . *Válisti fugla 2025*. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar nr. 61. Náttúrufræðistofnun. DOI: 10.33112/1027-832X.61

Paweł Wąsowicz 2020. Annotated checklist of vascular plants of Iceland. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar nr. 57. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands. DOI: 10.33112/1027-832X.57.

Sigurður H. Magnússon, Erling Ólafsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Guðmundur Guðjónsson, Kristbjörn Egilsson, Hörður Kristinsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2001.

Kárahnjúkavirkjun. Áhrif Háslóns á gróður, smádýr og fugla. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-01004.

Starri Heiðmarsson og Þorleifur Eiríksson 2025. Vistgerðir og fuglalíf á Katanesi við framkvæmdsvæði Aurora fiskeldis. ISSN 2547-6696. Rorum 2025 007.

Þorleifur Eiríksson, Sigurður Ívar Jónsson, Þorgerður Þorleifsdóttir, Halldór Pálmar Halldórsson, Hermann Dreki Guls og Þorleifur Ágústsson 2024. Rannsóknir vegna umhverfismats á framleiðslu rafeldsneytis Qair á Katanesi við Grundartanga. Unnið fyrir VSÓ fyrir hönd Qair, ISSN 2547-6696, ISBN 978-9935-514-33-2. RORUM 2024 001.

7 Viðaukar

7.1 Æðplöntutegundir fundnar í og við áætlað framkvæmdasvæði við Fellsenda.

Tegundir voru skráðar á níu ólíkum stöðum innan og rétt við svæðið, sbr. dálka 1-9 og staðsetningar á mynd 3-1.

Latneskt heiti	Íslenskt heiti	ALGENGNI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Agrostis stolonifera</i>	Skriðlingresi	#####				X		X			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Ilmeyr	#####	X	X	X		X	X		X	X
<i>Armeria maritima</i>	Geldingahnappur	#####				X					
<i>Bartsia alpina</i>	Smjörgras	#####		X			X				X
<i>Betula pubescens</i>	Birki	#####				X					
<i>Bistorta vivipara</i>	Kornsúra	#####		X	X	X		X	X		X
<i>Calluna vulgaris</i>	Beitilýng	#####				X		X	X		
<i>Caltha palustris</i>	Hófsóley	#####							X		
<i>Cardamine pratensis</i>	Hrafnaklukka	#####		X	X			X	X	X	X
<i>Carex bigelowii</i>	Stinnastór	#####	X			X	X				
<i>Carex canescens</i>	Blátoppastór	#####		X							X
<i>Carex capillaris</i>	Hárleggjastór	#####				X			X		
<i>Carex chordorrhiza</i>	Vetrarkvíðastór	#####		X							
<i>Carex limosa</i>	Flóastór	#####		X							
<i>Carex myosuroides</i>	Dursaskegg	#####					X				
<i>Carex nigra</i>	Mjrástór	#####		X	X				X	X	X
<i>Carex rostrata</i>	Tjarnastór	#####		X							
<i>Carex vaginata</i>	Slíðrastór	#####				X					
<i>Cerastium alpinum</i>	Músareyra	#####	X			X					
<i>Cerastium fontanum</i>	Vegarfi	#####							X		
<i>Comarum palustre</i>	Engjarós	#####		X							
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Snarrótarpuntur	#####		X	X	X				X	
<i>Draba incana</i>	Grávorblóm	#####									
<i>Empetrum nigrum</i>	Krækilýng	#####	X	X		X	X	X			X
<i>Equisetum fluviatile</i>	Fergin	#####				X			X		
<i>Equisetum palustre</i>	Mjrelilýng	#####		X	X				X	X	X
<i>Equisetum pratense</i>	Vallilýng	#####	X		X	X	X				
<i>Eriophorum angustifolium</i>	Klóifla	#####		X						X	X
<i>Festuca richardsonii</i>	Túnvingull	#####	X		X	X	X		X		
<i>Festuca vivipara</i>	Blávingull	#####	X			X		X	X		X
<i>Filipendula ulmaria</i>	Mjásbjurt	#####		X	X				X		
<i>Galium boreale</i>	Krossmaðra	#####	X				X				
<i>Galium normanii</i>	Hvítmaðra	#####	X	X	X	X		X	X		
<i>Galium verum</i>	Gulmaðra	#####		X	X	X	X	X	X		
<i>Hieracium</i>	Undafilfar	#####					X	X			
<i>Hierochloa odorata</i>	Riegrresi	#####		X	X						
<i>Juncus alpinoarticulatus</i>	Mjrasef	#####							X		
<i>Juncus arcticus</i>	Hrossanál	#####			X						
<i>Juncus biglumis</i>	Flagasef	#####				X			X		
<i>Juncus trifidus</i>	Móasef	#####				X	X				
<i>Koenigia islandica</i>	Nallagras	#####				X					
<i>Leontodon autumnalis</i>	Skartifill	#####			X			X	X	X	
<i>Leymus arenarius</i>	Melgresi	#####									
<i>Luzula multiflora</i>	Vallhera	#####	X	X	X	X		X		X	X
<i>Luzula spicata</i>	Ashæra	#####				X		X	X		
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Horbلاكa	#####								X	
<i>Parnassia palustris</i>	Mjrasóley	#####				X					
<i>Pilosella islandica</i>	Íslandsfífill	#####									
<i>Pinguicula vulgaris</i>	Lýfjagras	#####				X		X	X		
<i>Plantago maritima</i>	Kattartunga	#####	X			X	X	X	X		
<i>Platanthera hyperborea</i>	Fríggjagras	#####							X		
<i>Poa pratensis</i>	Vallarsveifgras	#####		X	X						
<i>Potentilla crantzii</i>	Gullmura	#####				X	X				
<i>Ranunculus subborealis</i>	Brennisóley	#####		X	X			X	X		
<i>Rhinanthus minor</i>	Lokasjóður	#####							X		
<i>Rumex acetosa</i>	Túnsúra	#####		X	X	X		X	X	X	
<i>Rumex acetosella</i>	Hundasúra	#####				X					
<i>Sagina procumbens</i>	Skammkrækill	#####				X					
<i>Salix arctica</i>	Fjallavísir	#####		X							
<i>Salix borealis</i>	Víða	#####						X			X
<i>Salix herbacea</i>	Grasvísir	#####	X			X	X	X			
<i>Salix phylicifolia</i>	Gulvísir	#####		X				X			X
<i>Sedum villosum</i>	Flagahnoðri	#####				X			X		
<i>Selaginella selaginoides</i>	Mozajáni	#####						X	X		
<i>Silene acaulis</i>	Lambagras	#####	X			X	X				
<i>Silene uniflora</i>	Holurt	#####						X	X		
<i>Taraxacum</i>	Túnfíttar	#####	X	X	X	X	X		X	X	X
<i>Thalictrum alpinum</i>	Brjóstagras	#####				X					
<i>Thymus praecox</i>	Blóðberg	#####	X	X	X			X	X		
<i>Trichophorum cespitosum</i>	Mjrafínungur	#####	X				X	X	X		
<i>Triglochin palustris</i>	Mjrasauðlaukur	#####							X		
<i>Vaccinium uliginosum</i>	Bláberjalng	#####		X		X	X	X			X
<i>Viola canina</i>	Tísfjóla	#####	X								
<i>Viola palustris</i>	Mjrfjóla	#####							X	X	

7.2 Æðplöntutegundir fundnar í áætluðu framkvæmdasvæði við Galtarvík.

Tegundir voru skráðar á átta ólíkum stöðum innan svæðisins, sbr. dálka 1-6, 8 og 9 auk þess sem nokkrar tegundir eru skráðar sem sáust á svæðinu. Staðsetningar skráningarstaðanna má sjá á mynd 3-2.

Latneskt heiti	Íslenskt heiti	ALGENGNI	1	2	3	4	5	6	8	9	á svæði
<i>Agrostis stolonifera</i>	Stárðingresi	■■■■■							X		
<i>Agrostis vinealis</i>	Týulíngresi	■■■■■				X	X				
<i>Alchemilla alpina</i>	Ljónslappi	■■■■■	X								
<i>Alchemilla filicaulis</i>	Hilamariustaktur	■■■■■				X					
<i>Alopecurus pratensis</i>	Hálságras	■■■■■				X					
<i>Angelica archangelica</i>	Æðhvönn	■■■■■							X		
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Ímreyr	■■■■■	X	X	X	X	X	X		X	
<i>Arabidopsis petraea</i>	Melablóm	■■■■■				X	X				
<i>Arenaria norvegica</i>	Skeggsandi	■■■■■					X				
<i>Argentina anserina</i>	Tágamara	■■■■■							X		
<i>Armeria maritima</i>	Geldingahappur	■■■■■					X				
<i>Atriplex glabriuscula</i>	Hrimblaða	■■■■■							X		
<i>Betula pubescens</i>	Birki	■■■■■						X			
<i>Bistorta vivipara</i>	Kornsóra	■■■■■								X	
<i>Botrychium lunaria</i>	Tungljurt	■■■■■									X
<i>Caltha palustris</i>	Héfsóley	■■■■■							X		
<i>Cardamine pratensis</i>	Hrafnakúka	■■■■■		X	X	X		X		X	
<i>Carex bigelowii</i>	Stinnastór	■■■■■	X			X	X				
<i>Carex canescens</i>	Blátoppastór	■■■■■									
<i>Carex capillaris</i>	Hárleggjastór	■■■■■					X				
<i>Carex chondrorhiza</i>	Vetrarívastór	■■■■■		X						X	
<i>Carex limosa</i>	Fílastór	■■■						X			
<i>Carex lyngbyei</i>	Gulstór	■■■■■									X
<i>Carex myosuroides</i>	Pursaskegg	■■■■■				X					
<i>Carex nigra</i>	Mýrastór	■■■■■		X	X					X	
<i>Carex panicea</i>	Belgjastór	■■■■■				X	X				
<i>Cerastium alpinum</i>	Mísareyra	■■■■■				X	X				
<i>Cerastium fontanum</i>	Vegarti	■■■■■					X	X			
<i>Comarum palustre</i>	Engjarós	■■■■■		X				X		X	
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Snarrótarpuntur	■■■■■		X	X	X					
<i>Draba incana</i>	Grávorblóm	■■■■■				X					
<i>Empetrum nigrum</i>	Krækilyng	■■■■■	X			X	X	X			
<i>Epilobium palustre</i>	Mýradúnurt	■■■■■							X		
<i>Equisetum arvense</i>	Kibelfting	■■■■■						X			
<i>Equisetum fluviatile</i>	Fergin	■■■■■					X				
<i>Equisetum palustre</i>	Mýrflétt	■■■■■		X						X	
<i>Equisetum pratense</i>	Vallflétt	■■■■■									X
<i>Eriophorum angustifolium</i>	Köfífa	■■■■■		X				X		X	
<i>Festuca richardsonii</i>	Túnvingull	■■■■■	X	X	X	X	X			X	
<i>Festuca vivipara</i>	Blávingull	■■■■■	X	X		X	X				
<i>Filipendula ulmaria</i>	Mjadjurt	■■■■■			X						
<i>Galium normanii</i>	Hvítmaðra	■■■■■	X	X		X				X	
<i>Galium verum</i>	Gulmaðra	■■■■■	X		X	X		X			
<i>Hippuris vulgaris</i>	Lóflotur	■■■■■									X
<i>Honkenya peploides</i>	Fjörurfi	■■■■■							X		
<i>Juncus arcticus</i>	Hrossanál	■■■■■			X						
<i>Juncus biglumis</i>	Flagasef	■■■■■					X				
<i>Juncus trifidus</i>	Móasef	■■■■■	X			X					
<i>Koenigia islandica</i>	Naflagras	■■■■■					X				
<i>Leontodon autumnalis</i>	Skarffífl	■■■■■					X				
<i>Lupinus nootkatensis</i>	Alaskalúpa	■■■■■									X
<i>Leymus arenarius</i>	Melgresi	■■■■■							X		
<i>Luzula multiflora</i>	Valthæra	■■■■■	X			X	X	X		X	
<i>Luzula spicata</i>	Auxhæra	■■■■■	X				X				
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Horblaða	■■■■■									X
<i>Mertensia maritima</i>	Blálla	■■■■■							X		
<i>Myosotis arvensis</i>	Gleym-mér-ei	■■■■■							X		
<i>Parnassia palustris</i>	Mýrasóley	■■■■■					X				
<i>Pilosella islandica</i>	Íslandsfífl	■■■■■					X				
<i>Pinguicula vulgaris</i>	Lyfjagras	■■■■■					X				
<i>Plantago maritima</i>	Kaltartunga	■■■■■	X			X	X			X	
<i>Plantago hyperborea</i>	Friggjargras	■■■■■									X
<i>Poa pratensis</i>	Vallarsveifgras	■■■■■			X			X			
<i>Populus trichocarpa</i>	Alaskabáp	■■■■■									X
<i>Potentilla crantzii</i>	Gulmúra	■■■■■	X			X				X	
<i>Pyrola minor</i>	Kúklublóm	■■■■■								X	
<i>Ranunculus subborealis</i>	Brennisóley	■■■■■			X			X			
<i>Ranunculus repens</i>	Skráðsóley	■■■■■									X
<i>Rhinanthus minor</i>	Lokasjóður	■■■■■					X				
<i>Rumex acetosa</i>	Túnsúra	■■■■■		X	X	X	X				
<i>Rumex longifolius</i>	Njál	■■■■■							X		
<i>Sagina procumbens</i>	Skammkrækil	■■■■■					X		X		
<i>Salix herbacea</i>	Grasvör	■■■■■				X	X	X		X	
<i>Salix lanata</i>	Lokvör	■■■■■						X			
<i>Salix phylicifolia</i>	Gulvör	■■■■■		X				X		X	
<i>Sedum villosum</i>	Flagahnoðri	■■■■■				X	X				
<i>Senecio vulgaris</i>	Krossfífl	■■■■■							X		
<i>Silene acaulis</i>	Lambagras	■■■■■				X	X				
<i>Silene uniflora</i>	Holurt	■■■■■							X		
<i>Spergula arvensis</i>	Skurfá	■■■■■					X				
<i>Taraxacum</i>	Túnfífl	■■■■■	X			X					
<i>Thymus praecox</i>	Bláðberg	■■■■■	X	X		X	X	X		X	
<i>Trichophorum cespitosum</i>	Mýrafinnungur	■■■■■				X	X				
<i>Trileurus pernum maritimum</i>	Baldursbrá	■■■■■							X		
<i>Vaccinium uliginosum</i>	Bláberjalýng	■■■■■		X				X		X	
<i>Viola canina</i>	Týsfjola	■■■■■	X			X					
<i>Viola palustris</i>	Mýrfjola	■■■■■						X			